

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

SERIES OF BIOLOGICAL AND MEDICAL

ISSN 2224-5308

Volume 5, Number 317 (2016), 174 – 181

V. N. Permitina¹, A. B. Baibulov²

¹Institute of Botany and Phytointroduction of CS MES, Almaty, Kazakhstan,

²Centre for Remote Sensing and GIS “Terra” JSC, Almaty, Kazakhstan.

E-mail: v.permitina@mail.ru, baibulov@gis-terra.kz

SOIL DIVERSITY IN FOREST-STEPPE ECOSYSTEMS OF NORTHERN KAZAKHSTAN

Abstract. This paper presents the results of complex studies of ecosystems in forest-steppe zone of Northern Kazakhstan. It describes the main types of terrestrial ecosystems, united by a relief type (alluvial plain) and grouped according to the type of water regime (automorphic, semihydromorphic and hydromorphic type). It presents the features of formation of separate ecosystem components: vegetation, species composition of communities, soil and soil cover. On the example of steppe plain region with splitting forests and meadow the variety of soils of forest-steppe ecosystems depending on soil formation conditions were identified. Automorphic ecosystems with the steppe vegetation type have typical zonal type of soil – chernozems, semihydromorphic ecosystems with the formation of steppe meadows and splitting forests have meadow-chernozem soils and meadow-steppe solonetz, gray forest soils and forests solods. Hydromorphic ecosystems are distinguished by the development of hydrophytic-grass vegetation on the meadow-marsh and marsh soils. A brief morphogenetic description of zonal and intrazonal soil types for identified ecosystems, occupying various positions in the landscapes and differ by genera and species features is given.

Keywords: forest-steppe, landscape, relief, ecosystems, vegetation, soil, soil formation processes.

УДК 631.4:574.4

В. Н. Пермитина¹, А. Б. Байбулов²

¹РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» КН МОН РК, Алматы, Казахстан,

²ТОО Центр дистанционного зондирования и ГИС «Терра», Алматы, Казахстан

РАЗНООБРАЗИЕ ПОЧВ В ЛЕСОСТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

Аннотация. В работе представлены результаты комплексных исследований экосистем лесостепной зоны северного Казахстана. Описаны основные типы наземных экосистем, объединенных по типу рельефа (аллювиальная равнина) и сгруппированных по типу водного режима (автоморфный, полугидроморфный и гидроморфный тип). Показаны особенности формирования отдельных компонентов экосистем: растительности, видового состава сообществ, почв, почвенного покрова. На примере колкового лугово-степного равнинного района выявлено разнообразие почв лесостепных экосистем в зависимости от условий и факторов почвообразования. Для автоморфных экосистем со степным типом растительности характерен зональный тип почв – черноземы, для полугидроморфных экосистем с формированием остеиненных лугов и колковых лесов типичны лугово-черноземные почвы и солонцы лугово-степные, серые лесные почвы и солоди лесные. Гидроморфные экосистемы отличаются развитием гидрофитно-злаковой растительности на лугово-болотных и болотных почвах. Приведена краткая морфогенетическая характеристика зональных и интразональных типов почв выделенных экосистем, занимающих различные позиции в ландшафтах и отличающихся по родовым и видовым признакам.

Ключевые слова: лесостепь, ландшафт, рельеф, экосистемы, растительность, почвы, процессы почвообразования.

Введение. Занимая переходное положение между лесолуговой и степной зонами, лесостепь характеризуется своеобразием экосистем и значительным разнообразием почв.

Для лесостепной зоны свойственно определенное сочетание природных экосистем, занимающих различные позиции в ландшафтах, которые возможно сгруппировать по отношению к режиму увлажнения на категории: автоморфные, полугидроморфные и гидроморфные. На возвышенных, хорошо дренированных участках выделяются автоморфные экосистемы, образование которых связано только с атмосферным увлажнением, зависящим от климатических условий. В понижениях различного генезиса складываются условия для формирования полугидроморфных и гидроморфных экосистем, находящихся под влиянием атмосферного и грунтового увлажнения.

Для автоморфных экосистем со степным типом растительности характерен зональный тип почв – черноземы, для полугидроморфных экосистем с формированием оstepненных лугов и колковых лесов типичны лугово-черноземные почвы и солонцы лугово-степные, серые лесные почвы и солоди лесные. Наряду с доминирующими степными и лесными природными комплексами получили распространение гидроморфные комплексы: луговые и болотные, отличающиеся развитием гидрофитно-злаковой растительности на лугово-болотных и болотных почвах.

В числе ведущих факторов почвообразования наряду с климатическими факторами, важную роль играет особенность почвообразующих и подстилающих пород, поверхностные и подземные воды, равнинность рельефа и специфика биотических компонентов. Взаимодействуя, данные факторы определяют на рассматриваемой территории ее ландшафтный облик, своеобразие наземных природных экосистем и разнообразие почв.

Изучение почв лесостепных экосистем основано на необходимом условии рационального природопользования, которое базируется на учете биосферных функций всех экосистем и важности сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, как основы экологической стабильности и устойчивого развития.

Методы исследования. Методология проведения работ включала традиционные методы изучения растительного и почвенного покрова [1, 2], определяемых условиями среды. Названия видов растений в тексте приводятся по С. К. Черепанову [3]. Факторы, характеризующие экологические условия (ранг геоморфологии, тип водного режима, тип растительности и тип почв), были использованы для выделения типов, групп и классов экосистем.

Методологической основой выполненных исследований послужили ландшафтные [4] и почвенные карты с определением классификационных единиц на уровне типов, подтипов, видов и разновидностей почв.

Для изучения процессов почвообразования, обусловливающих разнообразие почв в лесостепных экосистемах, закладывались разрезы на фоновых участках с однородным растительным покровом. Во вскрытых разрезах проводилось морфологическое описание профиля и отбор образцов из выделенных генетических горизонтов. Определение содержания химических элементов в почвенных образцах выполнялось по общепринятым методикам [5]. Таксономическое определение типов, подтипов, видов и разновидностей почв производилось на основе морфологических признаков и физико-химической характеристики в соответствии с принятой классификацией [6].

Результаты исследования. Район исследования принадлежит к Казахстанской провинции черноземов обыкновенных, занимающей южную окраину Западносибирской низменности, которая сложена древнеаллювиальными глинистыми отложениями, перекрывающими более древние морские, нередко засоленные отложения [7].

Для лесостепной зоны, представленной на севере Казахстана, характерно чередование бересковых и осиново-бересковых лесов на серых лесных почвах с безлесными участками, которые в северной части зоны заняты злаково-разнотравными и разнотравно-злаковыми луговыми степями на черноземах выщелоченных. В южной части лесостепной зоны преобладает колочная лесостепь. Здесь осиново-бересковые и бересковые колковые леса формируются на солодах лесных. Они чередуются с разнотравно-злаковыми степями, развивающимися на черноземах обыкновенных [8, 9].

Поверхность представляет слабо дренированную аллювиальную равнину с характерным западинным мезорельефом, представляющим чередование плоских или слабо всхолмленных поверхностей с небольшими понижениями, более мелкими западинами и более крупными падинами с плоским дном. Равнина сложена древнеаллювиальными отложениями, перекрывающими более

древние морские, нередко засоленные отложения. Грунтовые воды сильно минерализованные, залегают на глубине 4–6 м от поверхности.

Основой выделения экосистем как территориальных единиц служит ландшафтная структура исследуемой территории. Взаимосвязь в системе почва-растительность определяет выделение наземных экосистем с типом зональных почв. Типизация экосистем осуществлялась на основе следующих принципов: экосистемы объединяются в тип экосистем по принадлежности их к одной растительной ассоциации.

Под экосистемами понимаются природно-территориальные комплексы (ПТК), состоящие из двух основных частей: абиотической среды и живых организмов – биоты, в которых совершается внешний и внутренний круговорот вещества и энергии [10, 11]. Экосистемы обладают определенным уровнем взаимосвязей биотических компонентов и среды с особым режимом функционирования.

При выделении экосистем использовался комплексный, системный подход, позволяющий установить существующие взаимосвязи между компонентами внутри единой экосистемы (вертикальные взаимосвязи) и между соседствующими экосистемами (горизонтальные взаимосвязи) [12–15]. Для этого использовались наиболее физиономические признаки: формы рельефа и растительные сообщества [16]. Они являются основными, информативными компонентами экосистем и их индикаторами. Классификация экосистем проведена для экосистем локального уровня с выделением наземных природных экосистем.

Наземные экосистемы отражают основные закономерности распределения биоты в зависимости от геолого-геоморфологических, климатических, почвенных и других экологических условий (состав поверхностных отложений, степень их дренированности, водообеспеченности и пр.). В пределах района исследований наземные природные экосистемы отличаются определенным уровнем разнообразия типов экосистем, разделяющихся по формам мезо- и микрорельефа. Распределение экосистем подчинено широтно-зональным закономерностям, свойственным аллювиальным равнинам и определяющим условия жизнедеятельности биоты.

Обследованная территория представлена 9 типами наземных природных экосистем. В пределах автоморфной категории выделен 1 зональный класс экосистем: злаковых и разнотравно-злаковых степей на черноземах обыкновенных. В пределах полугидроморфной категории выделено 4 интразональных класса экосистем:

- разнотравно-злаковых оstepненных лугов на лугово-черноземных почвах;
- галофитно-злаковых оstepненных лугов на солонцах лугово-степных;
- колковых лесов с кустарниками на серых лесных почвах;
- колковых лесов на солодах лесных.

В пределах гидроморфной категории выделено 4 интразональных класса экосистем:

- злаковых лугов на луговых незасоленных почвах;
- галофитно-злаковых лугов на луговых засоленных почвах;
- гидрофитно-злаковых болот на лугово-болотных почвах;
- мохово-гидрофитно-злаково-осковых болот на болотных почвах.

Растительность равнинных территорий представлена типчаково-полынными сообществами, формирующимиися в комплексе с ковыльно-типчаковыми сообществами при участии лугового разнотравья. Плоскодонные замкнутые западины заняты березово-осиновыми колками. Более плоские и широкие понижения покрыты лугово-степной растительностью. Ближе к центру понижений развиваются ивняковые заросли с формированием лугового и лугово-болотного травянистого покрова.

Разнообразие почв обусловлено особенностью биоклиматических факторов с формированием зонального типа почв как генетической и крупной почвенно-геоморфологической единицы [17].

Природной подзоне колковых степей свойственно определенное сочетание зональных и интразональных почв. На возвышенных, хорошо дренированных участках формируются автоморфные зональные почвы. В понижениях складываются условия для формирования интразональных почв, находящихся под влиянием дополнительного поверхностного и грунтового увлажнения. Зональные и интразональные почвы занимают различные позиции в ландшафтах и находятся в геохимическом сопряжении.

Почвенный покров составляют комплексы черноземов обыкновенных нормальных и солонцеватых с солонцами степными. Под осиново-березовыми колками развиваются солоди лесные, под ивняковыми зарослями со злаково-осоковой травянистой растительностью – осоледелые и заболоченные почвы. Перифирию колков занимают луговые почвы. Между колками в наиболее плоских понижениях с неглубоким залеганием грунтовых вод (до 4–5 м) развиваются лугово-черноземные почвы. В комплексе с ними встречаются солонцы лугово-степные. Для почв лесостепи характерно высокое содержание гумуса, замедленная минерализация опада, прочная структура гумусового горизонта.

Обсуждение результатов. В пределах исследованной территории выделены наземные природные экосистемы, характеризующиеся преобладанием равнинного рельефа, который является основным элементом ландшафта и экосистем. В связи с этим проведено объединение экосистем по рельефу.

В зависимости от характера водного режима экосистемы сгруппированы в 3 крупные категории: автоморфные (климатогенные), полугидроморфные и гидроморфные. В автоморфных экосистемах водное питание растительности осуществляется за счет вод атмосферных осадков (грунтовые воды расположены глубже 5–6 м). В полугидроморфных экосистемах дополняется питание от грунтовых вод, залегающих на глубине 3–5 м. Гидроморфные экосистемы формируются при уровне грунтовой воды 1–3 м.

НАЗЕМНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ. Автоморфные экосистемы. Экосистемы злаковых и разнотравно-злаковых степей на черноземах обыкновенных. Экосистемы настоящих степей представлены по межколковым равнинным массивам. Для растительного покрова характерно доминирование дерновинных злаков – красный ковыль (*Stipa zalesskii*), ковыль-тырса (*Stipa capillata*), типчак (*Festuca valesica*), реже ковылок (*Stipa lessingiana*) и высокое разнообразие разнотравья. Естественными растительными сообществами являются богоразнотравно-красноковыльные (*Stipa zalesskii*, *Festuca valesiaca*, *Artemisia sericea*, *Phlomis tuberosa*, *Salvia stepposa* Shost., *Lathyrus odoratus*) и морковниково-красноковыльные (*Stipa zalesskii*, *Silaus besseri*) сообщества формирующиеся на черноземах обыкновенных нормальных среднегумусных.

Экосистемы сухих степей приурочены к возвышенным участкам равнин с преобладанием дерновинно-злаковых, типчаковых, ковыльно-типчаковых (*Festuca valesica*, *Stipa lessingiana*, *S. sareptana*) сообществ с ксерофитными кустарниками (карагана, таволга) и разнотравьем. К приподнятым понижениям рельефа приурочены дерновиннозлаковые с солонечником сообщества (*Festuca valesiaca*, *Galatella tatarica*) на черноземах обыкновенных солонцеватых среднегумусных.

По вершинам мелкосопочников и выходам коренных пород формируются петрофитные степи на черноземах обыкновенных малоразвитых. В составе растительных сообществ преобладает типчак и петрофитное разнотравье (*Festuca valesiaca*, *Stipa zalesskii*, *S. lessingiana*, *Sedum hybridum*, *S. telefium*, *Dianthus acicularis*, *Veronica incana*).

Черноземы обыкновенные залегают однородными массивами или образуют комплексы с солонцами. Они формируются на четвертичных суглинках или глинах, характеризуются мощным (60–80 см) гумусовым горизонтом с высоким содержанием в нем гумуса (7–9%). Углекислота карбонатов в количестве 4–5% присутствует в средней части профиля. Реакция почвенного раствора нейтральная (рН=7,0) и слабощелочная (рН=7,2–7,5) с увеличением щелочности в нижней части профиля. Черноземы солонцеватые отличаются меньшим количеством гумуса, содержат до 15% обменного натрия от суммы поглощенных оснований в солонцеватом горизонте. Почвы не засолены, по гранулометрическому составу преобладают суглинистые разновидности. Черноземы обыкновенные малоразвитые имеют укороченный профиль, обогащенный щебнем, характеризуются значительным содержанием гумуса в верхнем горизонте (6–9%), слабокислой (рН=6,5–6,7) реакцией почвенного раствора, наличием каменистой фракции в гранулометрическом составе.

Полугидроморфные экосистемы. Экосистемы разнотравно-злаковых и галофитно-злаковых оstepненных лугов на лугово-черноземных почвах и солонцах. Экосистемы наиболее возвышенных участков понижений, верхних озерных террас с преобладанием оstepненных разнотравно-злаковых (*Stipa zalesskii*, *Poa angustifolia*, *Bromopsis inermis*, *Filipendula hexapetala*, *Sanguisorba officinalis*) лугов на лугово-черноземных обыкновенных почвах.

Экосистемы приподнятых понижений с преобладанием галофитно-злаковых (*Festuca valesiaca*, *Psathyrostachys juncea*, *Agropyron ramosum*, *Stipa capillata*, *Phragmites australis*, *Artemisia nitrosa*, *Limonium gmelini*, *Plantago urvillei*) лугов формируются на лугово-черноземных солонцеватых почвах и солонцах лугово-степных.

Лугово-черноземные почвы, формирующиеся в условиях дополнительного поверхностного увлажнения, занимают межколковые пониженные пространства. Они встречаются небольшими участками среди черноземов, образуя с ними сочетания. Почвообразующими породами служат суглинки и глины. Почвы характеризуются гумусовым горизонтом мощностью до 50–70 см, выделением карбонатов на глубине ниже 60 см, признаками оглеения в нижней части гумусового горизонта. Содержание гумуса в гумусовом горизонте достигает 9–12%. Верхние горизонты содержат до 2% углекислоты карбонатов, в иллювиальном горизонте значение увеличивается до 4,8%. Реакция почвенного раствора слабощелочная при $\text{pH}=7,2\text{--}7,8$ с увеличением щелочности в нижнем горизонте. Лугово-черноземные почвы отличаются наличием до 5–9% обменного натрия в иллювиальном горизонте. Почвы не засолены, по гранулометрическому составу преобладают тяжелосуглинистые разновидности.

Солонцы лугово-степные приурочены к плоским понижениям рельефа, образуют комплексы с лугово-черноземными солонцеватыми почвами. Почвообразующими породами служат засоленные глины или тяжелые суглинки. Профиль ясно дифференцирован на генетические горизонты, содержание гумуса в гумусовом горизонте достигает 6–7%. Количество поглощенного натрия не превышает 20% от суммы поглощенных оснований. В подсолонцовом горизонте количество карбонатов составляет 3–5%. Солонцы засолены с глубины залегания иллювиального горизонта, тип засоления хлоридно-сульфатный. По гранулометрическому составу преобладают суглинистые разновидности.

Экосистемы колковых лесов на серых лесных почвах и солодях лесных. Экосистемы широких западин с преобладанием березовых (*Betula pendula*, *B. pubescens*) и осиново-березовых (*Populus tremula*, *Betula pendula*, *B. pubescens*) лесов на серых лесных почвах и солодах лесных.

Растительность колков располагается кольцеобразно. В глубоких западинах имеются три полосы: в центре располагается небольшое болото, на пологих склонах выражена полоса осинника или березняка с высокотравьем, по краю – со злаковым или разнотравно-злаковым покровом. В плоских западинах формируется две полосы. Для колков характерен подлесок из ивы (*Salix triandra*, *S. caprea*, *S. rosmarinifolia*), шиповника (*Rosa acicularis*, *R. pimpinellifolia*), спиреи (*Spiraea crenata*, *S. hypericifolia*), вишни степной (*Cerasus fruticosa*). В травяном ярусе присутствуют злаки (*Elytrigia repens*, *Festuca pratensis*, *Calamagrostis epigeios*, *Brachypodium pinnatum*), из разнотравья получили распространение *Artemisia latifolia*, *A. pontica*, *Salvia stepposa*, *Plantago urvillei*, *Achillea millefolium*, *Fragaria viridis*, *Rubus saxatilis*.

Серые лесные почвы занимают окраину колков, отличаются наличием лесной подстилки темно-бурового цвета мощностью до 5–10 см, под которой обособляется оторфованный горизонт с обилием корней растений. Глубже залегает плотный иллювиальный горизонт комковато-зернистой структуры с глянцевитостью на поверхности структурных отдельностей. Выделения ржавых пятен отмечается по всему профилю в виде мелких пятен и точек. Содержание гумуса в гумусовом горизонте составляет 3,5–4%, снижается с глубиной до 2%. Содержание углекислоты карбонатов достигает 2,0–6,0%. Реакция почвенного раствора слабощелочная при $\text{pH}=7,2\text{--}7,8$. Почвы не засолены, по гранулометрическому составу преобладают тяжелосуглинистые и глинистые разновидности.

Солоды лесные развиваются в условиях промывного режима. Они имеют резко дифференцированный на генетические горизонты профиль, белесоватый осолоделый горизонт слоевато-чешуйчатой структуры, плотный иллювиальный горизонт, отличается глубоким вскипанием. Содержание гумуса в верхнем горизонте в пределах 5–8% с резким падением в осолоделом горизонте. Реакция почвенного раствора кислая при $\text{pH}=5,7\text{--}6,2$. Почвы не засолены, по гранулометрическому составу преобладают суглинистые разновидности.

Гидроморфные экосистемы. Экосистемы злаковых и галофитно-злаковых лугов на луговых почвах. Экосистемы широких понижений с преобладанием злаково-разнотравных (*Elytrigia repens*, *Bromopsis inermis*, *Calamagrostis epigeios*, *Filipendula ulmaria*, *Geranium pratense*, *Veronica*

longifolia, *Anemone silvestris*, *Achillea millefolium*, *Plantago urvillei*) и галофитных разнотравно-бескильницевых (*Puccinellia hauptiana*, *Juncus gerardii*, *Halimione verrucifera*, *Salicornia europaea*) лугов на луговых обыкновенных и луговых засоленных почвах.

Луговые обыкновенные (незасоленные) почвы приурочены к широким межколковым понижениям. Почвы имеют и темноокрашенный гумусовый горизонт комковатой структуры мощностью до 70 см. В верхней части выделяется дерновинный горизонт. Гумусовый горизонт имеет темно-серую или серовато-черную окраску, которая в нижней его части приобретает буроватый оттенок. Выделения карбонатов отмечаются ниже гумусового горизонта. Содержание гумуса в гумусовом горизонте достигает 5,5–7,8%. Содержание углекислоты карбонатов изменяется от 0,9 до 6,6%. Реакция почвенного раствора слабощелочная при $\text{pH}=7,6\text{--}7,9$. Луговые засоленные почвы занимают низкие террасы озер, формируются в условиях близких (1–2 м) минерализованных грунтовых водах, отличаются невысоким содержанием гумуса и равномерным распределением его по профилю, высоким содержанием поглощенного натрия и легкорастворимых солей (свыше 1%), тип засоления смешанный: сульфатно-хлоридный и хлоридно-сульфатный. По гранулометрическому составу преобладают тяжелосуглинистые и глинистые разновидности.

Экосистемы болот на лугово-болотных и болотных почвах. Экосистемы западин с преобладанием гидрофитных длиннокорневищных трав и разнотравья (*Phragmites australis*, *Turpha angustipholia*, *Carex omsciana*, *C. caespitosa*, *Eleocharis acicularis*, *Stachys palustris*, *Butomus umbellatus*) с ивой (*Salix pentandra*) и участием мхов на лугово-болотных и болотных почвах.

В условиях избыточного увлажнения с близкими грунтовыми водами (0,5–1,5 м) развиваются лугово-болотные почвы, занимающие расположенные склоны западин центральной части колков. Среди лугово-болотных почв выделяются лугово-болотные незасоленные, лугово-болотные солончаковые и лугово-болотные осоледельные почвы. Профиль отличается наличием маломощного оторфованного горизонта, в нижней части которого наблюдаются признаки разложения торфа с присутствием небольшого количества мелкозема. Под ним залегает горизонт буровато-серого цвета с сизовато-белесыми глеевыми пятнами и выраженной мелкозернистой структурой. Выделение карбонатов обнаруживается в почвообразующей породе. Содержание гумуса в верхнем горизонте достигает 4,0–5,0%, снижается с глубиной до 0,7%. Углекислота карбонатов обнаруживается во втором метре (5%). Реакция почвенного раствора кислая ($\text{pH}=5,1\text{--}5,4$) и слабокислая ($\text{pH}=6,3\text{--}6,5$). По гранулометрическому составу преобладают суглинистые разновидности.

Болотные почвы занимают центральную часть колков, формируются при процессах поверхностного заболачивания. Среди болотных почв выделяются торфяно-болотные и иловато-болотные. Оторфованный горизонт черного цвета с белесыми пятнами, рыхлого сложения. Иллювиальный горизонт с признаками оглеения без выраженной структуры. Переходный к материнской породе горизонт отличается серовато-зеленым цветом с обилием ржавых пятен окиси железа. Содержание гумуса в верхнем горизонте достигает 12–13%, резко снижается с глубиной до 1,0–3,2%. Углекислота карбонатов обнаруживается в первом метре в количестве 4%. Реакция почвенного раствора слабокислая ($\text{pH}=6,3\text{--}6,6$) и слабощелочная ($\text{pH}=7,4$). Карбонаты обнаруживаются в почвообразующей породе. По гранулометрическому составу преобладают глинистые разновидности.

Выводы. Пространственное распределение основных типов почв и их разнообразие характеризуются общей закономерностью изменения условий почвообразования подзоны. Почвы, получившие распространение в лесостепных экосистемах, развиваются в подзоне умеренно влажной разнотравно-злаковой и колковой степи с преобладанием в почвенном покрове черноземов обыкновенных среднегумусных.

Условия почвообразования района исследований способствуют формированию почвенного разнообразия характерного для равнин южной части Западносибирской низменности с сочетанием автоморфного, полугидроморфного и гидроморфного режима увлажнения. В числе ведущих факторов почвообразования, наряду с климатическими факторами, важную роль сыграли группы геоморфологических, гидрологических и биотических факторов, в том числе – своеобразие подстилающих пород, поверхностных и подземных вод, равнинность рельефа и специфика биотических компонентов. Взаимодействуя, данные факторы определяют на рассматриваемой территории ее ландшафтный облик, особенности природно-территориальных комплексов и разно-

образие почв. Различия, формирующиеся в морфогенетических признаках и свойствах выделенных почв, связаны с преобладанием одного из основных процессов почвообразования: гумусово-аккумулятивный процесс, осолонцевание, осоложение или оглеение, что обуславливает изменение показателей мощности гумусового горизонта и содержания в нем гумуса, реакции почвенного раствора, наличие или отсутствие солей, особенности гранулометрического состава.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Полевая геоботаника. М.; Л.: Наука, 1959–1976. – Т. 1–5.
- [2] Почвенная съемка. Руководство по полевым исследованиям и картированию почв. – М: АН СССР, 1959. – 346 с.
- [3] Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. – СПб., 1995. – 992 с.
- [4] Ландшафтная карта Казахской ССР. М 1:2 500 000. – 1979.
- [5] Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. – М.: МГУ, 1970. – 490 с.
- [6] Классификация и диагностика почв СССР. – М.: Колос, 1977. – 223 с.
- [7] Почвенно-географическое районирование СССР. – М.: АН СССР, 1962. – С. 422.
- [8] Пачикина Л. И., Рубинштейн М.И. Почвы Казахской ССР. Почвы Kokchetavskoy области. – Алма-Ата: Наука, 1960. – Вып. 2. – 136 с.
- [9] Федорин Ю. В. Почвы Казахской ССР. Почвы Северо-Казахстанской области. – Алма-Ата: Наука, 1960. – Вып. 1. – 174 с.
- [10] Tensley A. The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terme // Ecology, 1935. – Vol 16, N 3. – P. 284–307.
- [11] Сукачев В.Н. Биогеоценоз как выражение взаимодействия живой и неживой природы на поверхности Земли: соотношение понятий «биогеоценоз», «экосистема», «географический ландшафт» и «фашия» // Основы лесной биогеоценологии. – М.: Наука, 1964. – С. 5–49.
- [12] Методические рекомендации по оценке и картографированию современного состояния экосистем МНР. – Улан-Батор, 1989. – 107 с.
- [13] Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – Л.: Наука, 1980. – 224 с.
- [14] Огарь Н.П. Принципы выделения экосистем как территориальных единиц для картографирования и экологической оценки // Терра. – 2006. – № 1. – С. 139–145.
- [15] Экосистемы Монголии. – М.: Наука, 1995. – 220 с.
- [16] Глобально значимые водно-болотные угодья Казахстана (Алаколь-Сасыккольская система озер). – Астана, 2007. – Т. 3. – 271 с.
- [17] Прасолов Л.И. О единой номенклатуре и основах генетической классификации почв. – Почвоведение, 1937. – № 6. – С. 5–17.

REFERENCES

- [1] Polevaya geobotanika. M.; L.: Nauka, **1959–1976**. Vol. 1–5 (In Russian).
- [2] Pochvennaya syemka. Rukovodstvo po polevyim issledovaniyam i kartirovaniyu pochv. M.: AN SSSR, **1959**. 346 p. (in Russian).
- [3] Cherepanov S.K. Sosudistye rasteniya Rossii i sopredelnyih gosudarstv. SPb., **1995**. 992 p. (Latin).
- [4] Landshaftnaya karta Kazahskoy SSR. M 1:2 500 000. **1979**.
- [5] Arinushkina E. V. Rukovodstvo po himicheskemu analizu pochv. M.: MGU, **1970**. 490 p. (In Russian).
- [6] Klassifikatsiya i diagnostika pochv SSSR. M.: Kolos, **1977**. 223 p. (In Russian).
- [7] Pochvenno-geograficheskoe rayonirovaniye SSSR. M.: AN SSSR, **1962**. P. 422 (In Russian).
- [8] Pachikina L. I., Rubinshteyn M.I. Pochvi Kazahskoy SSR. Pochvi Kokchetavskoy oblasti. Alma-Ata: Nauka, **1960**. Vyip. 2. 136 p. (In Russian).
- [9] Fedorin YU. V. Pochvi Kazahskoy SSR. Pochvi Severo-Kazahstanskoy oblasti. Alma-Ata: Nauka, **1960**. Vyip. 1. 174 p. (In Russian).
- [10] Tensley A. The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terme // Ecology. **1935**. Vol 16, N 3. P. 284–307 (In English).
- [11] Sukachev V.N. Biogeotsenoz kak vyirajenie vzaimodeystviya jivoy i nejivoy prirody na poverhnosti Zemli: sootnoshenie ponyatiy «biogeotsenoz», «ekosistema», «geograficheskiy landshaft» i «fatsiya» // Osnovy lesnoy biogeotsenologii. M.: Nauka, **1964**. P. 5–49 (In Russian).
- [12] Metodicheskie rekommendatsii po otsenke i kartografirovaniyu sovremenennogo sostoyaniya ekosistem MNR. Ulan-Bator, **1989**. 107 p. (In Russian).
- [13] Isachenko A.G. Metody prikladnyih landshaftnyih issledovanij. L.: Nauka, **1980**. 224 p. (In Russian).
- [14] Ogar N.P. Printsipyi vyideleniya ekosistem kak territorialnyih edinits dlya kartografirovaniya i ekologicheskoy otsenki // Terra, **2006**. N 1. P. 139–145 (In Russian).
- [15] Ekosistemyi Mongolii. M.: Nauka, **1995**. 220 p. (In Russian).
- [16] Globalno znachimye vodno-bolotnyie ugodya Kazahstana (Alakol-Sasyikkolskaya sistema ozer). Astana, **2007**. Vol. 3. 271 p. (In Russian).
- [17] Prasolov L.I. O edinoy nomenklature i osnovah geneticheskoy klassifikatsii pochv. Pochvovedenie, **1937**. N 6. P. 5-17 (In Russian).

В. Н. Пермитина¹, А. Б. Байбулов²

¹КР БФМ FK «Ботаника және фитоинтродукция институты» РМК, Алматы, Қазақстан,
²ЖШС Қашықтықтан зондтау және ГАЖ орталығы «Терра», Алматы, Қазақстан

СОЛТУСТІК ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОРМАНДЫ ДАЛАСЫНДАҒЫ ЭКОЖҮЙЕЛЕРІ ТОПЫРАҚТАРЫНЫң АЛУАН ТҮРЛІЛІГІ

Аннотация. Мақалада Солтұстік Қазақстан орманды дала аймағы экожүйелерінің кешенде зерттеулерінің інтижелері көрсетілген. Жер үсті экожүйелердің негізгі түрлері суреттелген, олар жер бедерінің түріне сәйкес біріктірілген (аллювиалды жазығы) және су режимінің түріне байланысты топтастырылған (автоморфты, гидроморфты және гидроморфты түрлер). Жекелеген экожүйе компоненттерін қалыптастыру ерекшеліктері көрсетілген: өсімдіктер, қауымдастықтардың түр құрамы, топырақ, топырақ жабындысы. Орман шоктары бар шалғынды-далалы жазық ауданы мысалында топырактың қалыптасу жағдайларына байланысты орманды дала экожүйелеріндегі топырактардың алуан түрлілігі анықталды. Өсімдіктердің дала түрлері қалыптасқан автоморфты экожүйелеріне топырактың аймақтық типтері тән – қара топырақ, орман шоктары мен дала шалғындары бар жартылай гидроморфты экожүйелер үшін шалғынды қара топырактар және шалғынды-дала сортандар тән, сұр орман және орман солоди топырактар типтері. Гидроморфты экожүйелер шалғынды-батпақты және батпақты топырактарда гидрофитті-шөптесін өсімдіктердің қалыптасуымен ерекшеленеді. Ландшафттардың әр түрлі жерлерінде оқшауланған және түр мен тек белгілерімен ерекшеленетін көрсетілген экожүйелердің аймақтық және интразоналды топырақ түрлерінің қысқаша морфогенетикалық сипаттамасы көлтірілген.

Түйін сөздер: орманды дала, ландшафт, мейірімділік, экожүйелер, өсімдік, топырақ, топырактың қалыптасу процестері.

Сведения об авторах:

Пермитина Валерия Николаевна – кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» КН МОН РК, 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева 36 «Д», тел. 394–76–42, факс: (727)394–80–40. E-mail: v.permitina@mail.ru

Байбулов Айбек Бекежанович – кандидат биологических наук, директор Департамента науки и проектирования, ТОО Центр дистанционного зондирования и ГИС «Терра», 050010, г. Алматы, мкр. Кок-Тобе, ул. Жабаева, 83, Тел. 272–62–10, факс: (727)291–78–87. E-mail: baibulov@gis-terra.kz