

УДК 591.81:534.121.2

A. Ш. КАНБЕТОВ

ДИФФУЗИЯ И ПАССИВНЫЙ ПЕРЕНОС ВЕЩЕСТВА ЧЕРЕЗ КЛЕТОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ

Отмечено, что проникновение вещества через клеточные мембранны происходит благодаря градиенту электрохимического потенциала и особенностям строения мембран.

Исходя из современного представления о молекулярной организации плазматической мембранны (два срединных липидных слоя и два белковых слоя, охватывающих снаружи и изнутри липидные слои) следует предположить наличие зависимости проницаемости такой перегородки, такого барьера, от гидрофильности или липофильности проникающих через такую перегородку молекул. Колландер и Берлоунд [7] на клетках хары показали, что скорость проникновения вещества зависит от их растворимости в липидах, а также от размеров их молекул. Липофильная молекула, пройдя через наружный белковый слой, «растворяется» в липидном слое и беспрепятственно проникает через мембрану. Гидрофильная же молекула проникает через белковый слой, «подталкивается» полярными его группами, но в конце концов наталкивается на неполярный липидный слой, являющийся для нее серьезным препятствием.

По мнению многих исследователей [4], пассивное проникновение вещества через клеточные мембранны обусловливается: а) градиентом концентрации этих веществ между внешней средой и содержимым клетки; б) проницаемостью самих мембранны благодаря особенностям их строения (наличие пор и др.).

Поскольку клеточные мембранны поляризованы, электрически заряженные частицы испытывают дополнительное электрическое сопротивление при прохождении через мембранны. Поэтому диффузия таких частиц осуществляется через мембранны медленней, чем диффузия неэлектролитов.

Согласно Деркачу [4], вещества с крупной молекулой, но хорошей способностью к растворению в липидной фазе, могут проникать через клеточные мембранны лучше, чем вещества с более мелкими молекулами и с плохой растворимостью в жирах. Поэтому, например, многоатом-

ные спирты проникают через клеточные мембранны значительно лучше, чем низкоатомные.

При прочих равных условиях крупные молекулы плохо проникают через плазматические мембранны, а также высокомолекулярные соединения, также как белки, нуклеиновые кислоты и др., в норме вообще не выходят за пределы клетки.

По А. Поликарпу [5], диффузия возможна лишь в случае, когда проникающее вещество растворимо в веществе мембранны. Диффузия связана с тепловым возбуждением молекул и не требует затраты дополнительной энергии.

Диффузии или пассивному переносу и другим вопросам мембранныго транспорта много уделили внимания М. В. Волькенштейн, С. Н. Фишман [1–3], А. С. Трошин [6] и др. В представлении названных авторов между цитоплазмой большинства клеток и окружающей их средой существует разность потенциалов в 50–70 мв, причем внутренняя сторона плазматической мембранны имеет отрицательный заряд. Эта разность потенциалов называется потенциалом покоя, который авторы рассматривают как диффузионный потенциал. Чтобы он оставался неизменным, должен поддерживаться градиент электрохимического потенциала диффундирующих ионов. Дело в том, что при пассивном транспорте движущей силой, создающей направленное движение ионов, является градиент электрохимического потенциала. В течение жизни этот градиент падал бы со временем, и распределение ионов между клеткой и средой стало равновесным, если бы в мембране не существовал биохимический аппарат, движущий ионы против градиента электрохимического потенциала. Этот механизм рассмотрен при изучении активного транспорта.

Итак, пассивное проникновение вещества через клеточные мембранны происходит благодаря градиенту электрохимического потенциала и особенностям строения мембран.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волькенштейн М.В., Фишман С.Н. Теория явления переноса в биологических мембранах. 1. Пассивный перенос и потенциал покоя // Биофизика. 1969. Т. 14, вып. 6. С. 1007-1008.
2. Волькенштейн М.В., Фишман С.Н. Теория явления переноса в биологических мембранах. 2. Активный перенос ионов // Биофизика. 1970. Т. 15, вып. 1. С. 31-38.
3. Волькенштейн М.В., Фишман С.Н. Теория мембранных транспорта // Вестник АН СССР. 1970. № 9. С. 44-48.
4. Деркач М.Ф. Основи біофізики. Львів, 1967. 275 с.
5. Поликар А. Молекулярная цитология мембранных систем животной клетки. М.: Мир, 1972. 158 с.

6. Цитология / Трошин А.С., Браун А.Д. и др. М.: Прогресс, 1970. 302 с.
7. Collander R. Barlund H. Permeabilitätsstudien an Chara ceratophyllum. 2. Die Permeabilität für Nichtelektrolyte // Acta bot. Fennica. 1933. V. 11. S. 5-114.

Summary

The substance penetration through the cellular membrane is happened due to the gradient of electro potential and due to membrane construction particularities.

Атырауский институт нефти и газа,

г. Атырау

Поступила 3.04.07г.