

**NEWS****OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN****SERIES OF AGRICULTURAL SCIENCES**

ISSN 2224-526X

Volume 4, Number 34 (2016), 47 – 52

**THE COMPARATIVE MORPHOLOGY  
OF SKINS STRUCTURE OF ASTRAKHAN LAMBS**

**M.K. Tuyekbasov, A.E. Kydyrbayeva, G.J. Turmetova**

South-west research institute of livestock and crop production, Shymkent, Kazakhstan;  
 Regional social innovation university, Shymkent, Kazakhstan;  
 Yassawi International Kazakh-Turkish University, Turkestan, Kazakhstan

**Keywords:** skin, histogenetika, selection, histomorphological analysis, hematoxylin, microscopic analysis, variational statistics, type of skin, the epidermis, pilar layer, reticular layer of the skin thickness, Karakul lamb.

**Abstract.** In the article it was studied histological features of individual layers and the thickness of the skin of karakul lambs from colored and astrakhan sheep types. It was revealed that most have thick skins of astrakhan lamb, which is especially expressed their pilar and reticular layers. The allocation for skins type highest rates were observed in Caucasian lambs, compared to lowland types. In conclusion, each coloring karakul pelts is different depending on the type lambs.

ӘОЖ 636.082

**ҚАРАҚӨЛ ҚОЗЫСЫ ТЕРІ ҚҰРЫЛЫМЫНЫң  
САЛЫСТЫРМАЛЫ МОРФОЛОГИЯСЫ**

**М.К. Туекбасов, А.Е. Қыдырбаева, Г.Ж. Турметова**

Оңтүстік - Батыс мал шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы, ФЗИ, Шымкент қ.;  
 Аймақтық әлеуметтік инновациялық университетті, Шымкент қ.;  
 Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетті, Туркістан

**Түйін сөздер:** тері жамылғысы, гистогенетика, селекция, гистоморфологиялық талдау, гематоксилин, микроскопиялық талдау, вариациялық статистика, елтіріп типті, эпидермис, пилияры қабат, ретикуляры қабат, тері қалындығы, қарақөл қозысы.

**Аннотация.** Мақалада әртүрлі түсті және елтірілік типті қарақөл қойы қозыларының терісінің қалындығы мен оның жекелеген қабаттарының гистологиялық зерттеулері салыстырмалы зерттелген. Алынған мәліметтерден қарақөл қозыларының терілері анағұрлым қалындау болып, бұл айырмашылықтар әсіресе пилиярың және ретикулярың қабаттарда байқалған. Қозыларды елтірілік типтері бойынша саралғанда, тері қалындығының негұрлым жогары көрсеткіштері кавказдық елтірілік типті қозыларда болса, төменгі мәні жазықтұрған елтірілік типтілерде алынған. Қорыта келе, қарақөл қозыларының әрбір түсі елтірілік типтіне байланысты өзіндік ерекшеліктері қарастырылған.

**Кіріспе**

Ауылшаруашылығы жануарларының тері жамылғысы физиологиялық жағынан сияқты, функционалдық міндеті жағынан да әрқашан да ғалымдардың назарын аудартады. Тері жамылғысы бұл көп компонентті жүйе, зерттеудердің көпшілігі фрагменттік сипатта болуы салдарынан кешенді морфологиялық және морфометриялық зерттеу жүргізу өте қыын. Қарақөл шаруашылығы қой шаруашылығының айрықша саласы, мұнда мамыр жүнді аң шаруашылығының гистогенетикасы басым болады, мұнда өнімнің селекциясы және өндірісі кезінде түс басты рөл атқарады. Бұдан басқа, қарақөл шаруашылығында қарақөлдің тауарлық құндылығының анықтау кезінде елтіріп типтінің (бұйралану пішіні мен өлшемі) маңызы үлкен. Жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, қарақөл қойы қозысының елтірісінің гистоморфологиялық ерекшеліктерін зерделеу кезінде біз қозылардың елтіріп типтіне және айрықша назар аудардық. Осы

бөлімшениң мақсатқа сәйкестігі, бұл терінің гистоморфологиялық құрылымының түс пен қозылардың елтірі типінің арасындағы өзара байланыс пен өзара шарттылық дәрежесін анықтау және заңдылықтарды айқындау, біздің пікірімізше, бұл келешекте түсті қаракөл шаруашылығындағы селекциялық процестерді жетілдіруге мүмкіндік береді.

**Зерттеу әдістемесі.** Зерттеулер үшін бастапқы материал «Оңтүстік-Қазақстан мал шаруашылығы және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС селекциялық-генетикалық орталығының қаракөл қойы қозылары болды. Терінің гистопрепараттарын дайындау және тері-қылышықты жамылғы құрылымын зерттеу Н.А.Демидовтың және т.б. [1] әдістемесі және қаракөл шаруашылығы институтының әдістемесі бойынша, ҚазКШФЗИ гистоморфологиясының түрлендірілген зертханасымен [2] жүргізілді. Гистокесінділерді бояу келесідей жүргізілді: микротом пышағынан алынған кесінділер Судан III бояуына салынды, бұл бояу май бездерінің май қосындыларын сарғылт түске бояйды, бұның біріншілік және екіншілік фолликулдарды анықтау кезінде үлкен көмегі бар. Судан бояуынан алынған кесінділер алдымен 50 градустық спиртте, одан кейін дистилденген суда шайылды және жетілген және ұрықтанған фолликулдардың жасушаларында ядролық заттарды анықтау үшін гематоксилин Кораччи бояуының ерітіндісіне көшірілді. Гематоксилиннен кесінділер дистилденген суға, одан соң заттық әйнекке орналастырылды. Созылған гистокесіндіге желатин + глицерин қоспасының үлкен тамшысын тамызылды және жамылғы әйнегімен абайлап жабылды. Микроскопиялық талдау МБИ-3 микроскопының көмегімен келесі көрсеткіштер бойынша жасалды: терінің бетіне қатысты тік көріністе дайындалған препараттарда: эпидермис биіктігі 7x40 ұлғайтылған кездे анықталды. Терінің пилярлық және ретикулярлық қабаттарының қалындығы 7x3,5 ұлғайтылып өлшеннеді. Нағыз терінің байланыстыруши тіндік талшықтарының құрылымы (7x40). Микроскоптаудың экспозициялық интервалдары зерттелуші құрылымдардың шамаларының әркелкілігімен түсіндіріледі. Әрбір гистопрепараттағы өлшеу саны 20. Эксперименталдық деректер М.К.Туекбасовтың, Б.Турумбетовтің [2] әдістемелік ұсынымы бойынша МК-61 микрокалькуляторды пайдаланумен, вариациялық статистика әдісімен биометриялық жолмен өндеді [3, 4].

**Зерттеу нәтижелері.** Қаракөл қойы қозыларының терісінің гистоморфокұрылымының және оның қабаттарының ерекшеліктерін неғұрлым объективті бейнелеу мақсатында біз әрбір елтірі типі бойынша осы зерттеулерді жеке кестелер түрінде ұсындық. Қаракөл қойы қозыларының терісінің қалындығын гистологиялық зерттеулер түсі мен елтірі типіне байланысты тері параметрлерінің түрлі шамалары болатынын көрсетті. Мысалы, жакеттік елтірі типті қаратусті қозылардың терісінің жалпы қалындығы 1810,3 мкм, сұртсті – 2002,2 мкм, ақ түсті – 2469,4 мкм, қоңыр түсті – 2102,9 мкм, гулигаз – 2140,4 мкм, қазақы сұр – 2305,5 мкм, бұхар сұры – 1863,9 мкм, сұрхандария сұр – 2027,9 мкм, қарақалпақ сұр типті – 2118,7 мкм (1-кесте).

1-кесте - Жакеттік елтірі типті қозылардың тері қабаттарының параметрлері

Қозы түсі	Эпидермис	Пилярлы қабат	Ретикулярлы қабат	Терінің жалпы қалындығы
Қара	24,5±0,27	1345,1±31,6	470,7±16,8	1810,3
Сұр	23,1±0,18	1386,5±41,3	592,8±36,7	2002,2
Ақ	23,4±0,23	1724,5±47,2	721,5±26,5	2469,4
Қоңыр	23,7±0,34	1471,7 ±0,51	607,5±31,7	2102,9
Гулигаз (алқызыл)	24,1±0,18	1503,5±0,62	612,8±26,3	2140,4
Қазақы сұры	24,4±0,11	1529,7±0,76	751,4±21,5	2305,5
Бұхар сұры	23,4±0,26	1345,2±0,39	495,3±25,9	1863,9
Сұрхандария сұры	24,7±0,34	1438,5±0,42	564,7±31,4	2027,9
Қарақалпақ сұры	25,9±0,23	1501,4 ±46,7	591,4±39,6	21187

Бұл ауытқулар терінің жекелеген қабаттарының эпидермистің, пилиярлық және ретикулярлық қабатының түрлі шамаларымен алдын ала анықталған. Жакеттік елтірі типті қозылардың арасында эпидермистің ең үлкен шамасы каракалпақ сұр – 25,9 мкм, бұдан әрі сұрхандария сұр типті қозыларда (24,7 мкм), қара түсті (24,5 мкм), қазақ сұр (24,4 мкм), гулигаз типті (24,1 мкм) қозыларда болады. Сұр, ақ, қоңыр түсті және бұхар сұртипті қозыларда эпидермис қалындығы бірдей (23,1-23,7 мкм). Пилиярлық қабат шамаларында елеулі айырмашылықтар байқалады, мұнда пилиярлық қабаттың ең аз шамасы қара түсті (1345,1 мкм), бұхар сұры (1345,2) және сұр түсті (1386,5 мкм) қозыларда. Ақ түсті қозыларға пилиярлық қабаттың қалындаған пішіні P<0,01 кезінде қарақалпақ сұр (1501,4 мкм), гулигаз (1503,5 мкм) және қазақ сұр типті (1529,7 мкм) қозыларда болады.

Жакеттік елтірі типті қозылардың ретикулярлық қабатының қалындығы сондай-ақ түсіне қарай айтартылғатай өзгереді. Мысалы, ретикулярлық қабаттың ең үлкен қалындығы қазақ сұр типті (751,4 мкм) және ақ түсті (721,5 мкм) қозыларда болады, қоңыр түсті және гулигаз типті қозылармен салыстырғанда айырмашылықтар статистикалық тұрғыда айқын (P<0,01), басқа түсті қозылармен салыстырғанда айырмашылықтар статистикалық тұрғыда жоғары дәрежеде айқын (P<0,001).

Қабырға елтірі типті қозылардың терісінің қалындығы жакеттік елтірі типті қозылармен салыстырғанда біршама жұқа және түсіне қарай өз ерекшеліктері болады (2-кесте).

2-кесте – Қабырға елтірі типті қозылардың тері қабаттарының параметрлері

Қозы түсі	Эпидермис	Пилиярлық қабат	Ретикулярлық қабат	Терінің жалпы қалындығы
Қара	22,7±0,32	1224,2±24,5	411,3±17,5	1658,2
Сұр	23,3±0,27	1329,5±31,4	543,2±31,8	1896,0
Ақ	25,7±0,19	1680,5±56,4	701,8±36,3	2408,0
Қоңыр	23,4±0,34	1381,5±41,3	626,5±29,2	2031,4
Гулигаз (алқызыл)	26,2±0,41	1465,2±56,3	665,2±47,1	2156,6
Қазақ сұры	27,3±0,26	1598,4±22,8	617,1±17,4	2242,8
Бұхар сұры	24,5±0,14	1279,5±41,3	536,2±21,9	1835,2
Сұрхандария сұры	25,9±0,26	1382,5±31,9	597,4±36,5	2005,8
Қарақалпақ сұры	25,7±0,21	1403,6±46,7	614,5±52,3	2043,8

Басқа түсті қозылармен салыстырғанда (P<0,001) қазақы сұртүсті қозылардың эпидермисінің қалындығы мейлінше үлкен болады (27,3 мкм). Қабырға елтірі типті қозылардағы эпидермистің ең аз қалындығы қара түсті (22,7 мкм), сұр түсті (23,3 мкм) және қоңыр түсті (23,4 мкм) қозылардың арасында анықталған. Ақ түсті, гулигаз және сұр тобының қозыларының эпидермисінің қалындығы 24,5-26,2 мкмшегінде ауытқыды. Пилиярлық қабаттың қалындығында біршама айырмашылықтар байқалады, түстер кимасында олар айтартылғатай. Мысалы, ақ түсті (1680,5 мкм) және қазақ сұр (1598,4 мкм) типті қозылары пилиярлық қабаттың қалындаған пішінімен сипатталады, ал өз кезегінде қара түсті (1224,2 мкм) және бұхар сұр түсті (1279,5 мкм) қозыларда ең жұқа пилиярлық қабат болады.

Пилиярлық қабаттың біршама орташаландырылған пішіні сұр түсті, қоңыр түсті, сұрхандария сұр, қарақалпақ сұржәне гулигаз түсті қозыларда болады, олардың параметрлері 1329,5-1465,2 мкм шегінде болады. Қозылардың түсіне байланысты елеулі айырмашылықтар ретикулярлық қабаттың қалындығында да байқалады. Ретикулярлық қабаттың ең аз қалындығы қара түсті қозыларда анықталды, бұдан әрі біршама қалындаған ретикулярлық қабат бұхар сұр (536,2 мкм), сұр түсті (543,2 мкм) және сұрхандария сұр типті (597,4 мкм) қозыларда байқалады. Ретикулярлық қабаттың қалындаға шамасына қарай келесі топқа қазақ сұр (617,1 мкм), қоңыр түсті (626,5 мкм) және гулигаз типті (665,2 мкм) қозылар кіреді, ал ретикулярлық қабаттың ең жоғары шамалары ақ

түсті қозыларда анықталды (701,8 мкм). Жазық елтірі типті қозылардың терісінің жекелеген қабаттары мен жалпы қалындығын зерттеу (3-кесте), эпидермис қалындығының 23,5-26,3 мкм шегінде ауытқытынын көрсетті, бұл кезде қара түсті (24,3 мкм), сұр түсті (24,5 мкм) бұхар сұр(24,7 мкм), қоңыр түсті (24,8 мкм) қозылармен салыстырғанда эпидермистің ең үлкен қалындығы қазақ сұр (26,3 мкм), қарақалпақ сұр(25,9 мкм) және сұрхандария сұр(25,6 мкм)типті қозыларда болады, ал эпидермистің ең аз шамасы ақ түсті қозыларда болады ( $P<0,01$ ).

Жазық елтірі типті қозылардың пилиярлық қабатының қалындығында да түсіне байланысты белгілі бір айырмашылықтар байкалады. Мысалы, басқа түсті қозылармен салыстырғанда ақ түсті қозылардың пилиярлық қабатының қалындығы ең үлкен болады ( $P<0,001$ ). Сұр қозылардың арасында пилиярлық қабаттың ең үлкен шамасы қазақ сұр типтің қозыларында болады ( $P<0,01$ ), қарақалпақ сұр және сұрхандария сұр типті қозылардың пилиярлық қабатының шамалары 1364,9-1317,4 мкм шегінде болады ( $P<0,1$ ), ал ең жұқа пилиярлық қабат бұхар сұр типті қозыларда болады ( $P<0,01$ ).

3-кесте – Жазық елтірі типті қозылардың тері қабаттарының параметрлері

Қозы түсі	Эпидермис	Пилиярлық қабат	Ретикулярлық қабат	Терінің жалпы қалындығы
Кара	24,3±0,41	1147,8±29,4	387,6±16,5	1559,7
Сұр	24,5±0,19	1242,5±36,2	419,2±15,7	1686,2
Ақ	23,5±0,12	1620,4±41,7	670,4±32,9	2314,3
Қоңыр	24,8±0,17	1346,5±52,6	554,8±33,7	1926,1
Гулигаз (алқызыл)	25,2±0,26	1394,4±43,2	582,3±40,2	2001,9
Қазақ сұры	26,3±0,73	1432,9±14,7	625,3±12,5	2084,5
Бұхар сұры	24,7±0,42	1245,3±26,5	517,6±26,7	1787,6
Сұрхандария сұры	25,6±0,28	1317,4±31,2	541,4±51,4	1884,4
Қарақалпақ сұры	25,9±0,35	1364,9±42,7	596,5±42,3	1987,3

Қоңыр түсті (1346,5 мкм) және гулигаз типті (1394,4 мкм) қозылардың пилиярлық қабатының қалындығы бірдей дерлік ( $P>0,1$ ). Θз кезегінде, қара түсті (1147,8 мкм) және сұр түсті (1242,5 мкм) қозыларда пилиярлық қабаттың ең аз шамалары болады ( $P<0,001$ ).

Ұқсас үрдіс ретикулярлық қабаттың құрылымында да байқалады, тек мұндағы айырмашылық, пилиярлық қабатпен салыстырғанда ретикулярлық қабаттың шамалары аз болады ( $P<0,001$ ). Ретикулярлық қабаттың ең үлкен қалындығы ақ түсті (670,4 мкм) және қазақ сұр типті (625 мкм) қозыларда анықталды, қоңыр түсті, гулигаз, бұхарсұр, сұрхандария сұржәне қарақалпақ сұр типті қозылардың ретикулярлық қабатының қалындығы 517,6-596,5 мкм құрайды, ал ретикулярлық қабаттың ең аз шамалары ( $P<0,001$ ) кезінде қара түсті (387,6 мкм) және сұр түсті (419,2 мкм) қозыларда. Терінің жекелеген қабаттарының қалындығында белгіленген айырмашылықтар терінің жалпы қалындығында білінді. Мысалы, осы көрсеткіш бойынша басқа түсті қозылардың терісінің қалындығымен салыстырғанда ақ түсті қозылардың терісінің жалпы қалындығының шамасы ең үлкен болады (2314,3 мкм,  $P<0,001$ ). Гулигаз және қазақ сұр типтің қозыларының терісінің қалындығы 2001,9-2084,5 мкм шегінде болады, бұхарсұр, сұрхандария сұр және қарақалпақ сұртипті қозыларда бұл көрсеткіш 1787,6-1987,3 мкм құрайды, ал ең төмен көрсеткіштер (1555,7-1686,2 мкм) қара түсті қозыларда.

Кавказ типті қозылардың терісінің жекелеген қабаттары мен жалпы қалындығын зерттеу (4-кесте), кавказ елтірі типті қозылар терінің жалпы қалындығы бойынша жакеттік, қабырга және жазық елтірі типті қозылардан статистикалық түрғыдағы айқын шамаға асып түсетінін көрсетті ( $P<0,01$ ).

4-кесте – Кавказ елтірі типті қозылардың тери қабаттарының параметрлері

Қозы түсі	Эпидермис	Пилярлы қабат	Ретикулярлы қабат	Терінің жалпы қалындығы
Кара	26,5±0,39	1453,4±21,2	520,7±19,3	2000,6
Сұр	23,7±0,18	1512,5±31,7	574,6±21,0	2110,8
Ақ	24,3±0,14	1866,5±41,5	746,2±41,1	2637,0
Қоңыр	25,1±0,15	1431,5±46,2	605,6±21,4	2062,2
Гулигаз (алқызыл)	26,7±0,24	1426,4±51,3	614,5±18,3	2067,6
Қазақ сұры	28,1±0,13	1647,5±62,4	790,9±39,5	2466,5
Бұхар сұры	25,4±0,19	1465,8±31,4	579,2±26,4	2070,4
Сұрхандария сұры	26,7±0,21	1486,5±42,1	660,2±39,8	2173,4
Қарақалпақ сұры	24,8±0,13	1511,4±0,59	696,7±31,9	2232,9

Эпидермиялық қабаттың өз ерекшеліктері болады, мысалы қазакы сұр типтің қозыларының эпидермисінің ең үлкен шамалары (28,1 мкм), ал сұр түсті (23,7 мкм), ақ түсті (24,3 мкм) және қарақалпақ сұр (24,8 мкм) қозыларының эпидермисінің ең аз шамалары болады ( $P<0,01$ ). Пилярлық қабатта ең үлкен шамалар ақ түсті қозыларда (1866 мкм) белгіленді, олар бұл көрсеткіш бойынша барлық басқа қозылардан статистикалық тұрғыдағы айқын шамаға асып түседі ( $P<0,001$ ). Өз кезегінде қазақ сұр типтің қозыларында басқа түсті қозылармен салыстырғанда пилярлық қабаттың негұрлым жоғары параметрлері бар (ақ түсті қозылардан басқа) ( $P<0,001$ ). Қара түсті, қоңыр түсті, гулигаз, бұхар сұржәне сұрхандария сұр қозылардың пилярлық қабаттының қалындығы бірдей дерлік және 1426,4-1486,5 мкм шегінде ( $P>0,1$ ).

Ретикулярлық қабатта сондай-ақ өзіне тән ерекшеліктері бар, қазақ сұр типтің (790,9) және ақ түсті (746,2) қозылардың ретикулярлық қабаттының ең үлкен шамалары болады ( $P<0,001$ ), сұрхандария сұр (660,2 мкм) және қарақалпақ сұр қозыларының ретикулярлық қабаттының параметрлері 660,2-696,7 мкм құрайды ( $P<0,1$ ), ал ретикулярлық қабаттың ең кіші көрсеткіштері кара түсті (520,7 мкм), сұр түсті (574,6 мкм) және бұхар сұр (579,2 мкм) қозыларда.

### Қорытынды

Сонымен, қаралған қоның қозыларының терісінің қалындығын және оның жекелеген қабаттарын гистологиялық зерттеулерді салыстырмалы талдау қара түсті, сұр түсті, қоңыр түсті, гулигаз, бұхар сұр, сұрхандария сұр және қарақалпақ сұр типті қозылармен салыстырғанда ақ түсті және қазақ сұр тұқымшілік типтің қозыларының негұрлым қалындау тері жамылғысы болатынын көрсетті, бұл айырмашылықтар әсіресе пилярлық және ретикулярлық қабаттарда байқалады. Сондай-ақ елтірі типтері мен тері қалындығы арасында да белгілі бір тәуелділік байқалады, бұл айырмашылықтар барлық жекелеген қабаттарда жақсы байқалады. Негұрлым айырмашылықтар пилярлық және ретикулярлық қабаттарда, тері қалындығының негұрлым жоғары шамалары қавказ елтірі типті қозыларында, бұдан әрі жакеттік елтірі типтің, қабырға елтірі типтің қозыларында және тері қалындығының ең аз шамалары жазық елтірі типтің қозыларында, демек, тері қабаттарының дамуы ғана емес, сондай-ақ байланыстыруышы талышқардың орналасуы мен тығыздығы маңызды рөл атқарады. Жалпы әрбір түс үшін, қозылардың елтірі типтіне қарай, өзіндік ерекшеліктер тән.

### ӘДЕБИЕТ

- [1] Диомидова Н.А., Панфилова Е.П., Суслина Е.С. Методика исследования волосяных фолликулов, М., 1960, 10 с.
- [2] Ерофеев В.С., Шамекенова Р.Д., Туекбасов М.К. Методика дифференцированного определения густоты шерстистых волокон у каракульских ягнят, Шымкент, 1992, 8с.
- [3] Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников, М., 1969, 255 с.
- [4] Меркурьева Е.К., Шангин-Березовский Г.Н. Генетика с основами биометрии, М., 1983, 400 с.
- [5] Туекбасов М.К., Турумбетов Б. Биометрическая обработка данных научных экспериментов в животноводстве, Шымкент, 1991, 20 с.

**REFERENCES**

- [1] Diomidova N.A., Panfilova E.P., Sushina E.S. Metodika issledovaniya volosyanyh follikulov, M., 1960, 10 с.
- [2] Erofeev V.S., Shamekenova R.D., Tuyekbasov M.K. Metodika differencirovannogo opredeleniya gustoty sherstyanyh volokon u karakulskih yagnyat, Shymkent, 1992, 8s.
- [3] Plokhinskiy N.A. Rukovodstvo po biometrii dlya zootehtikov, M., 1969, 255 s.
- [4] Merkuryeva E.K., Shangin-Berezovkiy G.N. Genetika s osnovami biometrii, M., 1983, 400 s.
- [5] Tuyekbasov M.K., Turumbetov B. Biometricheskaya obrabotka dannyh nauchnyh eksperimentov v zhivotnovodstvo, Shymkent, 1991, 20 s.

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ СТРУКТУРЫ ШКУРОК КАРАКУЛЕВЫХ ЯГНЯТ**

**М.К.Туекбасов, А.Е. Кыдырбаева, Г.Ж. Турметова**

НИИ Южно – Западного животноводства и растениеводства, г. Шымкент, Казахстан;

Региональный социальный инновационный университет, г. Шымкент, Казахстан;  
Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави, г. Туркестан, Казахстан

**Ключевые слова:** кожные покровы, гистогенетика, селекция, гисто-морфологический анализ, гематоксилин, микроскопический анализ, вариационная статистика, тип шкурки, эпидермис, пиллярный слой, ретикулярный слой, толщина кожи, ягненок каракульский.

**Аннотация.** В статье сравнительно исследованы гистологические особенности отдельно взятых слоев и толщина кожного покрова каракулевых шкурок ягнят от разноцветных и каракулевых типов овец. Выявлено, что наибольшей толщиной обладают шкурки каракулевых ягнят, что особенно выражено на их пиллярных и ретикулярных слоях. При распределении по типу шкурок наиболее высокие показатели наблюдались у кавказских ягнят по сравнению с равнинными типами. Вывод: каждая расцветка каракулевых шкурок имеет свои особенности в зависимости от типа ягнят.

*Поступила 15.07.2016 г.*