

C. A. АБДЫМАНАПОВ

О ЗАДАЧЕ РИМАНА–ГИЛЬБЕРТА ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ n -ГО ПОРЯДКА НА ПЛОСКОСТИ С СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ

Задача Римана–Гильберта для эллиптических систем первого порядка на плоскости с сингулярной точкой изучена в работах [1–3]. Работы [4, 5] посвящены исследованиям разрешимости обобщенных задач Римана–Гильберта для эллиптических систем второго и третьего порядков на плоскости с сингулярной точкой. В работе [6] рассмотрена задача Римана–Гильберта для одного класса линейных эллиптических систем n -го порядка на плоскости с сингулярной точкой.

Пусть $0 < \beta < 1$, $0 < \gamma < 1$, n – целое число, удовлетворяющее неравенству

$$n < \frac{1-\gamma}{2\beta} + \frac{1+\gamma}{2},$$

и $G = \{z : |z| < 1\}$, $\Gamma = \{t : |t| = 1\}$.

Через $S(G)$ обозначим пространство измеримых и существенно ограниченных в G функций $f(z)$ с нормой

$$\|f(z)\|_{S(G)} = \sup_{z \in G} \nu rai |f(z)|.$$

Ниже также используем следующие пространства. $S_v(G)$ – класс функций $f(z)$, для которых $|z|^\nu \cdot f(z) \in S(G)$, где ν – действительное число. Норма в $S_v(G)$ определяется по формуле

$$\|f\|_{S_v(G)} = \| |z|^\nu \cdot f(z) \|_{S(G)},$$

где $W_{q,\beta}^n(G)$ – класс функций $f(z)$, для которых $\frac{\partial^{\beta,n}}{\partial z^n} \in L_q(G)$.

Здесь $\frac{\partial^{\beta,1}}{\partial z} = \frac{\partial^\beta}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial}{\partial \bar{z}} - \beta \frac{z}{\bar{z}} \frac{\partial}{\partial z}$, $0 < \beta < 1$, $\frac{\partial^{\beta,k}}{\partial z^k} = \frac{\partial^\beta}{\partial \bar{z}} \left(\frac{\partial^{\beta,k-1}}{\partial z^{k-1}} \right)$, $k \geq 2$ – целое число.

$W_{q,\beta}^n(G, \gamma)$ – класс функций $f(z)$, представимых в G в виде $f(z) = (z|z|^\theta)^{-\gamma} \cdot f_0(z)$, где $f_0(z) \in W_{q,\beta}^n(G)$, $\theta = \frac{2\beta}{1-\beta}$; $U_0(z)$ – класс голоморфных в G функций.

Рассмотрим в G уравнение

$$\frac{\partial^{\beta,n} W}{\partial z^n} + \sum_{k=1}^{n-1} A_k(z) \frac{\partial^{\beta,n-k} W}{\partial z^{n-k}} + A_n(z) \cdot H_1(z, W) + B(z) \cdot H_2(z, \bar{W}) = F(z), \quad (1)$$

где $A_k(z) \in S_k(G)$, $(k = \overline{1, n})$, $B(z) \in S_n(G)$, $F(z) \in S_\gamma(G)$.

$H_1(z, W)$ и $H_2(z, \bar{W})$ как функции от z , измеримы и существенно ограничены в G , относительно W удовлетворяют условиям:

$$H_1(z, 0) = H_2(z, 0), \quad (2)$$

$$\left\| \frac{H_1(z, W_1) - H_1(z, W_2)}{W_1 - W_2} \right\|_{S(G)} < c_1, \quad \left\| \frac{H_2(z, \bar{W}_1) - H_2(z, \bar{W}_2)}{W_1 - W_2} \right\|_{S(G)} < c_2, \quad (3)$$

$c_1 > 0$, $c_2 > 0$ – заданные действительные числа.

Если $H_1(z,0) \neq 0$, $H_2(z,0) \neq 0$, то предполагая, что

$$H_k(z,0) \in S_{\gamma-n}(G), \quad (k=1,2),$$

уравнение (2) мы можем записать в виде

$$\frac{\partial^{\beta,n} W}{\partial z^n} + \sum_{k=1}^{n-1} A_k(z) \frac{\partial^{\beta,n-k} W}{\partial z^{n-k}} + A_n(z) \cdot H_3(z, W) + B(z) \cdot H_4(z, \bar{W}) = F_1(z),$$

где функции

$$H_3(z, W) = H_1(z, W) - H_1(z, 0),$$

$$H_4(z, \bar{W}) = H_2(z, \bar{W}) - H_2(z, 0)$$

удовлетворяют условиям (2), (3), а

$$F_1(z) = F(z) - A_n(z) \cdot H_1(z, 0) - B(z) \cdot H_2(z, 0) \in S_\gamma(G).$$

Мы отыскиваем решение уравнения (1) из класса

$$S_{\gamma-n}(G) \cap W_{q,\beta}^n(G), \quad 2 < q < \frac{2}{\gamma}, \quad (4)$$

удовлетворяющее краевому условию

$$\operatorname{Re}[t^{-m} W(z)] = g(t), \quad t \in \Gamma, \quad (5)$$

где m – целое число, $g(t) \in C^\alpha(\Gamma)$, $\alpha = 1 - \frac{2}{q}$.

Таким образом, мы рассматриваем здесь канонический вид обобщенной задачи Римана–Гильберта, к которому приводятся более общие случаи [7].

Задача Римана–Гильберта для уравнения (1) при $B(z) \equiv 0$ изучена в работе [8]. В зависимости от соотношения между m и n нам приходится формулировать эту задачу в различном виде.

а) Пусть $m \geq n$. Тогда рассмотрим задачу:

Задача A_1 . Требуется найти решение уравнения (1) из класса (4), удовлетворяющее граничному условию (5).

Решение задачи A_1 будем искать в виде

$$W(z) = \left(\prod_G^{\beta,m} U \right)(z) + (z | z |^\theta)^n \Phi(z | z |^\theta), \quad (6)$$

где

$$\begin{aligned} \left(\prod_G^{\beta,m} U \right)(z) &= \left(T_G^{\beta,n} U \right)(z) + \frac{(-1)^n (z | z |^\theta)^{2m-n+1}}{(1-\beta)^n \pi^n} \iint_G \frac{dG_{\zeta_1}}{\zeta_1 (1 - \overline{\zeta}_1 |\zeta_1|^\theta |z| |z|^\theta)} \cdot \iint_G \frac{dG_{\zeta_2}}{\zeta_2 (\overline{\zeta}_2 |\zeta_2|^\theta - \overline{\zeta}_1 |\zeta_1|^\theta)} \times \\ &\times \iint_G \frac{dG_{\zeta_3}}{\zeta_3 (\overline{\zeta}_3 |\zeta_3|^\theta - \overline{\zeta}_2 |\zeta_2|^\theta)} \Lambda \cdot \iint_G \frac{dG_{\zeta_{n-1}}}{\zeta_{n-1} (\overline{\zeta}_{n-1} |\zeta_{n-1}|^\theta - \overline{\zeta}_{n-2} |\zeta_{n-2}|^\theta)} \iint_G \frac{\overline{U(\zeta_n)} dG_{\zeta_n}}{\zeta_n (\overline{\zeta}_n |\zeta_n|^\theta - \overline{\zeta}_{n-1} |\zeta_{n-1}|^\theta)}, \\ \left(T_G^{\beta,k} U \right)(z) &= \frac{(-1)^k (z | z |^\theta)^k}{(1-\beta)^k \pi^k} \iint_G \frac{dG_{\zeta_1}}{\zeta_1 (\zeta_1 |\zeta_1|^\theta - z | z |^\theta)} \times \\ &\times \iint_G \frac{dG_{\zeta_2}}{\zeta_2 (\zeta_2 |\zeta_2|^\theta - \zeta_1 |\zeta_1|^\theta)} \Lambda \cdot \iint_G \frac{U(\zeta_k) dG_{\zeta_k}}{\zeta_k (\zeta_k |\zeta_k|^\theta - \zeta_{k-1} |\zeta_{k-1}|^\theta)}, \\ \theta &= \frac{2\beta}{1-\beta}, \end{aligned}$$

$U(z)$ – новая неизвестная функция из $S_\gamma(G)$, $0 < \gamma < 1$, $\Phi(z') \in U_0(G')$; G' – образ области G при отображении $z' = z | z |^\theta$. Функцию $\Phi(z | z |^\theta)$ выбираем так, чтобы функция $W(z)$, представленная в виде (6), удовлетворяла условию (5). Для этого функцию $\Phi(z | z |^\theta)$ представим в виде

$$\Phi(z|z|^{\theta}) = (D_n^{\beta}g)(z) + \Phi_m(z|z|^{\theta}), \quad (7)$$

где

$$(D_n^{\beta}g)(z) = \frac{(z|z|^{\theta})}{2\pi i} \int_{\Gamma} g(t) \frac{t+z|z|^{\theta}}{t-z|z|^{\theta}} \cdot \frac{dt}{t},$$

$$\Phi_m(z|z|^{\theta}) = \sum \left(\alpha_k \left((z|z|^{\theta})^k - (z|z|^{\theta})^{2(m-n)-k} \right) + i\beta_k \left((z|z|^{\theta})^k + (z|z|^{\theta})^{2(m-n)-k} \right) \right) + i\beta_{m-n} (z|z|^{\theta})^{m-n},$$

если $n \geq m+1$, $\Phi_m(z|z|^{\theta}) = i\beta_0$, если $n = m$. Здесь α_k, β_k , ($k = \overline{0, m-n-1}$), β_{m-n} – произвольные действительные числа.

Если подставим представление (7) в формулу (6), то функция $W(z)$, определяемая по формуле (6), автоматически удовлетворяет краевому условию (5). Подставив эту функцию $W(z)$ в уравнение (1), получим для $U(z)$ интегральное уравнение

$$U(z) = (P_4 U)(z), \quad (8)$$

где

$$\begin{aligned} (P_4 U)(z) = & - \sum_{k=1}^{n-1} A_k(z) (T_G^{\beta, k})(z) - A_n(z) \cdot H_1 \left(z, \left(\prod_G^{\beta, m} U \right)(z) + (z|z|^{\theta})^n \Phi(z|z|^{\theta}) \right) - \\ & - B(z) \cdot H_2 \left(z, \overline{\left(\prod_G^{\beta, m} U \right)(z)} + (\bar{z}|z|^{\theta})^n \overline{\Phi(\bar{z}|z|^{\theta})} \right) + F(z). \end{aligned}$$

Здесь функция $\Phi(z|z|^{\theta})$ определена по формуле (7).

При получении формулы (8) использованы следующие дифференциальные свойства оператора $(\prod_G^{\beta, m} U)(z)$:

$$\frac{\partial^{\beta, l}}{\partial z^l} \left(\prod_G^{\beta, m} U \right)(z) = (T_G^{\beta, n-l} U)(z), \quad (l = \overline{1, n-1}),$$

$$\frac{\partial^{\beta, n}}{\partial z^n} \left(\prod_G^{\beta, m} U \right)(z) = U(z).$$

Оператор $(P_4 U)(z)$ переводит пространство $S_{\gamma}(G)$, $0 < \gamma < 1$ в себя и для любых $U_1, U_2 \in S_{\gamma}(G)$ справедлива оценка

$$\|(P_4 U_1)(z) - (P_4 U_2)(z)\|_{S_{\gamma}(G)} \leq M \cdot \|U_1 - U_2\|_{S_{\gamma}(G)},$$

где

$$M = \sum_{k=1}^{n-1} M_k \|A_k\|_{S_k(G)} + M_{n+1} (c_1 \cdot \|A_n\|_{S_n(G)} + c_2 \cdot \|B\|_{S_n(G)}),$$

$$M_1 = \sup_{z \in G} \frac{|z|^{\gamma+\theta}}{(1-\beta)\pi} \iint_G \frac{dG_{\zeta}}{|\zeta|^{1+\gamma} \cdot |\zeta| \cdot |\zeta|^{-\theta} - z|z|^{\theta}},$$

$$M_2 = \sup_{z \in G} \frac{|z|^{\gamma+2\theta}}{(1-\beta)^2 \pi^2} \iint_G \frac{dG_{\zeta_1}}{|\zeta_1| \cdot |\zeta_1| \cdot |\zeta_1|^{\theta} - z|z|^{\theta}} \iint_G \frac{dG_{\zeta_2}}{|\zeta_2|^{1+\gamma} \cdot |\zeta_2| \cdot |\zeta_2|^{\theta} - \zeta_1|\zeta_1|^{\theta}}, \Lambda,$$

$$\begin{aligned}
M_n &= \sup_{z \in G} \frac{|z|^{\gamma+n\theta}}{(1-\beta)^n \pi^n} \iint_G \frac{dG_{\zeta_1}}{|\zeta_1| \cdot |\zeta_1| |\zeta_1|^\theta - z |z|^\theta} \iint_G \frac{dG_{\zeta_2}}{|\zeta_2| \cdot |\zeta_2| |\zeta_2|^\theta - \zeta_1 |\zeta_1|^\theta} \Lambda \\
&\Lambda \iint_G \frac{dG_{\zeta_n}}{|\zeta_n|^{1+\gamma} |\zeta_n| |\zeta_n|^\theta - \zeta_{n-1} |\zeta_{n-1}|^\theta} + \sup_{z \in G} \frac{|z|^{(2m-n+1)(1+\theta)}}{(1-\beta)^n \pi^n} \iint_G \frac{dG_{\zeta_1}}{|\zeta_1| \cdot |1 - \bar{\zeta}_1| |\zeta_1|^\theta} z |z|^\theta \times \\
&\times \iint_G \frac{dG_{\zeta_2}}{|\zeta_2| \cdot |\zeta_2| |\zeta_2|^\theta - \zeta_1 |\zeta_1|^\theta} \Lambda \cdot \iint_G \frac{dG_{\zeta_{n-1}}}{|\zeta_{n-1}| \cdot |\zeta_{n-1}| |\zeta_{n-1}|^\theta - \zeta_{n-2} |\zeta_{n-2}|^\theta} \times \\
&\times \iint_G \frac{dG_{\zeta_n}}{|\zeta_n|^{1+\gamma} (\zeta_n |\zeta_n|^\theta - \zeta_{n-1} |\zeta_{n-1}|^\theta)}.
\end{aligned}$$

Поэтому при $M < 1$ в силу принципа сжатых отображений существует единственное решение уравнения (8) из класса $S_\gamma(G)$. Легко можно показать, что функция $W(z)$, определяемая по формулам (6), (7), принадлежит классу (4). Следовательно, имеет место

Теорема 1. При $m \geq n$ и $M < 1$ задача A_1 всегда разрешима. Многообразие решений этой задачи может быть найдено по формулам (6), (7), где $U(z)$ – решение уравнения (8) из класса $S_\gamma(G)$.

б) Пусть $m < n$. В этом случае формулу (6) мы не можем использовать сразу, так как тогда получится задача с отрицательным индексом. Поэтому сначала введем в рассмотрение функцию

$$V(z) = (z | z |^\theta)^{n-m} \cdot W(z).$$

Задачу Римана–Гильберта теперь поставим в следующем виде:

Задача A_2 . Требуется найти решение уравнения (1), где $A_k(z) \in S_k(G)$, ($k = \overline{1, n}$), $A_n(z) \in S_n(G)$, $B(z) \in S_n(G)$, $F(z) \in S_{m-n+\gamma}(G)$, $0 < \gamma < 1$, $H_1(z, W)$ и $H_2(z, \bar{W})$ как функции от z , измеримы и существенно ограничены в G , относительно W удовлетворяют условиям (2), (3), из класса

$$S_{\gamma-m(1+\theta)}(G) \cap W_{q,\beta}^n(G, (m-n)(1+\theta)), \quad (9)$$

удовлетворяющее граничному условию (5).

Функция $V(z)$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial^{\beta,n} W}{\partial z^n} + \sum_{k=1}^{n-1} A_k(z) \frac{\partial^{\beta,n-k} W}{\partial z^{n-k}} + A_n(z) \cdot H_{n-m,1}(z, V) + B(z) \cdot H_{n-m,2}(z, \bar{V}) = F_{n-m}(z), \quad z \in G, \quad (10)$$

где

$$\begin{aligned}
H_{n-m}(z, V) &= (z | z |^\theta)^{n-m} \cdot H_1(z, (z | z |^\theta)^{n-m} V(z)), \\
H_{n-m,2}(z, \bar{V}) &= (z | z |^\theta)^{n-m} \cdot H_2(z, (\bar{z} | z |^\theta)^{n-m} \bar{V}(z)), \\
F_k(z) &= (z | z |^\theta)^k F(z),
\end{aligned}$$

и краевому условию

$$\operatorname{Re}[t^{-n} V(t)] = g(t), \quad t \in \Gamma. \quad (11)$$

Задачи (10), (11) соответствуют задаче из пункта а) при $m = n$. Поэтому решение этой задачи из класса (9) имеет вид

$$V(z) = \left(\prod_G^{\beta,n} U \right)(z) + (z | z |^\theta)^n \Phi(z | z |^\theta), \quad (12)$$

где $\Phi(z | z |^\theta) = (D_0^\beta g)(z) + i\beta_0$.

Функция, заданная по формуле (12), автоматически удовлетворяет условию (5). Если функцию, заданную по формуле (12), подставим в уравнение (10), то получим интегральное уравнение

$$U(z) = (P_5 U)(z), \quad (13)$$

где

$$\begin{aligned} (P_5 U)(z) = & -\sum_{k=1}^{n-1} A_k(z) \left(T_G^{\beta,k} \right)(z) - A_n(z) \cdot H_1 \left(z, \left(\prod_G^{\beta,n} U \right)(z) + (z | z |^\theta)^n \cdot \Phi(z | z |^\theta) \right) - \\ & - B(z) \cdot H_2 \left(z, \overline{\left(\prod_G^{\beta,n} U \right)(z)} + (\bar{z} | z |^\theta)^n \cdot \overline{\Phi(z | z |^\theta)} \right) + F_{n-m}(z). \end{aligned}$$

Очевидно, что $F_{n-m}(z) \in S_\gamma(G)$. Оператор $(P_5 U)(z)$ является сжатым в классе $S_\gamma(G)$ при $M < 1$.

Следовательно, при $M < 1$ существует единственное решение уравнения (13) из класса $S_\gamma(G)$. Функция $V(z)$, определяемая по формуле (12), принадлежит классу (4). Поэтому из формулы $V(z) = (z | z |^\theta)^{n-m} \cdot W(z)$ следует, что функция $W(z)$ принадлежит классу (9). Итак, доказана

Теорема 2. При $m < n$ и $M < 1$ задача A_2 всегда разрешима. Многообразие решений этой задачи может быть найдено по формуле $W(z) = (z | z |^\theta)^{n-m} \cdot V(z)$, где $V(z)$ определяется из (12), (13).

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдыманапов С.А., Тунгатаров А.Б. Некоторые классы эллиптических систем на плоскости с сингулярными коэффициентами. Алматы: Фылым, 2005. 169 с.
2. Тунгатаров А.Б. К теории уравнения Карлемана-Векуа с сингулярной точкой // Математический сборник. 1993. Т. 184, № 3. С. 111-120.
3. Тунгатаров А.Б. К теории обобщенной системы Коши-Римана с сингулярной точкой // Сиб. математический журнал. 1993. Т. 34, № 4. С. 207-216.
4. Беркембаев Е.Н., Тунгатаров А.Б. Об одном классе эллиптических систем на плоскости 2-го порядка с сингулярной точкой выше первого порядка // Вестник КазГУ им. аль-Фараби. Серия мат., мех., информ. 1998. №6. С. 147-152.
5. Кисикова Н.М., Тунгатаров А. Б. Об одном классе эллиптических систем 3-го порядка на плоскости с сингулярной точкой // Вестник КазГУ им. аль-Фараби. Серия мат., мех., информ. 1998. №10. С. 81-88.
6. Тунгатаров А.Б. Об одном классе эллиптических систем n -го порядка на плоскости с сингулярной точкой // Математический журнал. Алматы, 2001. Т. 1, №1. С. 94-99.
7. Векуа И.И. Обобщенные аналитические функции. М.: Физматгиз, 1959. 28 с.
8. Абдыманапов С.А. Задача Римана-Гильберта для одного класса нелинейных эллиптических систем n -го порядка на плоскости с сингулярной точкой // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия мат., мех., инф. 2005. № 4(47). С. 12-16.

Резюме

Негізгі тарауда Бельтрам операторы арқылы жазықтықтағы сингулярлық нүктелі n -реттегі сызықты емес эллиптикалық жүйенің бір класы үшін Риман-Гильберттің жинақтау есебінің шешілу мәселелері зерттелген. Қорсетілген есептің үздіксіз шешілу мүмкіндігінің жеткілікті жаздайы бар екені алынған.

Summary

In this work solved Riemann-Hilbert problem for the nonlinear n -order elliptic systems in the plane with singular point.

УДК 517.9

Евразийский университет им. Л. Н. Гумилева,
г. Астана

Поступила