

*С. А. АЙТКЕЛЬДИЕВА¹, Э. Р. ФАЙЗУЛИНА¹, О. Н. АУЭЗОВА²,
А. А. КУРМАНБАЕВ¹, С. Т. ИБРАГИМОВА¹, Н. С. ДАМЕНОВА³*

ОЧИСТКА НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖАНАТАЛАП АКТИВНЫМИ ШТАММАМИ НЕФТЕОКИСЛЯЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ

Большую опасность для окружающей среды представляет загрязнение почв нефтью в процессе ее добычи и транспортировки, так как происходит комплексное загрязнение токсичными углеводородами, буровыми растворами, пластовыми засоленными водами и тяжелыми металлами. На трассах трубопроводов зона разрушения может достигать 400 м. На предприятиях нефтепереработки, нефтехимии и нефтебазах почва загрязняется на значительную глубину, в грунтах под почвой могут образовываться линзы нефтепродуктов, которые могут попасть в грунтовые воды и загрязнить другие смежные среды. Возникает глобальная проблема загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами [1]. Например, в Атырауской области площади нефтезагрязненных почв составляют 1,3 млн. га, на отдельных промыслах глубина загрязнения составляет 10 м [2].

В результате негативного воздействия нефти на почву происходит ее деградация, ухудшение

свойств, возрастает содержание негидролизуемого остатка, засоление почвы, снижается порозность, падает содержание илистых частиц [3]. При этом происходит интенсивное затухание микробиологических процессов, поддерживающих ее плодородие.

В связи с этим все более актуальной становится разработка эффективных способов санации очагов техногенного загрязнения углеводородными соединениями.

Современная практика рекультивационных работ насчитывает довольно большое разнообразие способов очистки почвы от нефтепродуктов, однако полное восстановление биоценоза обеспечивают технологии, которые имеют своим завершением биоремедиацию. Технология биоремедиации основана на биодеградации углеводородов нефти под воздействием углеводородокисляющих микроорганизмов, способных усваивать нефтепродукты в качестве единственного источника углерода и энергии.

Цель настоящей работы – изучение возможности использования активных штаммов нефтеокисляющих микроорганизмов для очистки нефтезагрязненной почвы месторождения Жанаталап Атырауской области.

Материалы и методы. Для модельных экспериментов по очистке нативной нефтезагрязненной почвы использовали активные культуры нефтеокисляющих микроорганизмов *Micrococcus roseus* 34, *Rhodococcus maris* 65, *Acinetobacter calcoaceticus* 2-А, *Arthrobacter globiformis* 44-А, *Microbacterium lacticum* 41-3 и ртутьустойчивые штаммы T1/12, T6/1, T10/77, T10/79, BB28.

В сосуды вносили по 100 г почвы, 10 г цеолита, азот и фосфор в виде $(\text{NH}_4)_2\text{PO}_4$. Культуры активных штаммов микроорганизмов выращивали на косяках РПА, затем стерильной водопроводной водой делали смывы в стерильную посуду. Для каждой культуры использовали отдельную колбу. Полученную суспензию вносили по 25 мл в каждый сосуд с загрязненной почвой. В качестве контроля служили нефтезагрязненные почвы с и без добавления цеолита и минеральных добавок. Почву периодически (раз в неделю) взрыхляли и увлажняли.

Определение исходного содержания нефти в почве и количество остаточной нефти через 2 мес эксперимента определяли гравиметрическим методом. С этой целью почвенные образцы экстрагировали гексаном и хлороформом.

Для определения численности физиологических групп микроорганизмов использовали стандартные микробиологические среды и методы [4, 5].

Результаты и обсуждение. Заложены модельные эксперименты по очистке нативной нефтезагрязненной почвы, отобранный на месторождении Жанаталап Атырауской области, активными культурами нефтеокисляющих микроорганизмов *Micrococcus roseus* 34, *Rhodococcus maris* 65, *Acinetobacter calcoaceticus* 2-А, *Arthrobacter globiformis* 44-А, *Microbacterium lacticum* 41-3 и ртутьустойчивыми штаммами T1/12, T6/1, T10/77, T10/79, BB28. Контролем являлась почва с и без внесения цеолита и минеральных добавок.

До постановки эксперимента в почве определяли исходное содержание нефти гравиметрическим методом. Результаты показали, что количество нефти в почве составило 35026 мг/кг почвы. Одновременно проводили микробиологический анализ используемой почвы. Установлено, что общее микробное число (ОМЧ) составило $(3,67 \pm 0,35) \times 10^5$ кл/г, численность споровых бактерий была $(2,79 \pm 0,30) \times 10^4$ кл/г, углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ) – 95 кл/г, грибов – $(1,07 \pm 0,19) \times 10^3$ кл/г.

Через два месяца после внесения активных нефтеокисляющих и ртутьустойчивых культур произошла убыль нефти на 25–60,4% (табл. 1). Тогда как в контроле 1 она составила 4,1%, в контроле 2 (с цеолитом) – 13,8%. Наибольшую активность показал штамм *Microbacterium lacticum* 41-3, наименьшую – штамм T10/79. Штаммы *Acinetobacter calcoaceticus* 2-А, *Rhodococcus maris* 65, *Arthrobacter globiformis* 44-А, T1/12 и T6/1 утилизировали более 40% нефти.

Таблица 1. Содержание нефти в почве
после обработки активными культурами нефтеокисляющих микроорганизмов

Культура	Количество нефти, мг/кг почвы		Степень утилизации нефти, %
	исходное	через 2 мес	
<i>Micrococcus roseus</i> 34	35026	21390,0	38,9
<i>Rhodococcus maris</i> 65	35026	19967,5	43,0
<i>Acinetobacter calcoaceticus</i> 2-А	35026	19145,0	45,4
<i>Arthrobacter globiformis</i> 44-А	35026	20227,5	42,3
<i>Microbacterium lacticum</i> 41-3	35026	13890,0	60,4
T1/12	35026	20000,0	42,9
T6/1	35026	19702,5	43,6
T10/77	35026	23747,5	32,2
T10/79	35026	26272,5	25,0
BB28	35026	24547,5	30,0
Контроль 1 (загрязненная почва)	35026	33587,5	4,1
Контроль 2 (загрязненная почва с цеолитом)	35026	30210,0	13,8

Таблица 2. Численность физиологических групп микроорганизмов через 2 мес

Культура	ОМЧ, кл/г	Грибы, кл/г	Споровые бактерии, кл/г	УОМ, НВЧ кл/г
<i>Micrococcus roseus</i> 34	(1,03±0,12)·10 ⁷	(1,73±0,78)·10 ³	(8,0±0,49)·10 ⁴	4,5·10 ⁵
<i>Rhodococcus maris</i> 65	(1,67±0,67)·10 ⁷	(5,33±0,33)·10 ²	(8,23±0,54)·10 ⁴	2,5·10 ⁵
<i>Acinetobacter calcoaceticus</i> 2-A	(1,98±0,37)·10 ⁷	(2,57±0,50)·10 ³	(7,70±1,07)·10 ⁴	4,5·10 ⁶
<i>Arthrobacter globiformis</i> 44-A	(1,78±0,31)·10 ⁷	(2,75±0,94)·10 ³	(8,07±0,35)·10 ⁴	2,5·10 ⁶
<i>Microbacterium lacticum</i> 41-3	(7,0±0,36)·10 ⁷	(2,45±0,41)·10 ³	(7,20±0,56)·10 ⁴	1,1·10 ⁶
T1/12	(3,46±0,49)·10 ⁸	(3,47±1,09)·10 ³	(3,03±0,10)·10 ⁶	4,5·10 ⁶
T6/1	(2,96±0,81)·10 ⁸	(2,50±0,52)·10 ³	(3,94±0,15)·10 ⁶	4,5·10 ⁶
T10/77	(9,30±0,35)·10 ⁷	(6,57±1,25)·10 ³	(2,73±0,22)·10 ⁶	2,0·10 ⁷
T10/79	(1,89±0,34)·10 ⁸	(4,20±0,36)·10 ³	(2,49±0,35)·10 ⁶	2,0·10 ⁷
BB28	(3,65±0,08)·10 ⁸	(1,77±0,35)·10 ³	(3,07±0,34)·10 ⁶	2,0·10 ⁶
Контроль 1 (загрязненная почва)	(5,10±1,16)·10 ⁶	(7,0±0,97)·10 ³	(1,05±0,07)·10 ⁵	4,5·10 ⁵
Контроль 2 (загрязненная почва с цеолитом)	(1,20±0,06)·10 ⁷	(1,80±0,38)·10 ³	(5,80±0,53)·10 ⁴	3,0·10 ⁵

Примечание. НВЧ кл/г – наиболее вероятное число клеток в 1 г почвы.

Микробиологический анализ показал, что через два месяца после внесения нефтеокисляющих штаммов ОМЧ увеличилось на два порядка и колебалось в пределах $(1,03-9,30) \cdot 10^7$ кл/г, тогда как в контроле 1 – только на один порядок и составило $5,1 \cdot 10^6$ кл/г (табл. 2).

Численность споровых бактерий осталась примерно на том же уровне для вариантов со штаммами 34, 65, 2-А, 44-А и 41-3, для вариантов с ртутьустойчивыми штаммами она возросла на два порядка. Содержание грибов изменилось незначительно. В то же время резко возросло количество УОМ. В опытных вариантах насчитывалось $2,5 \cdot 10^5 - 2,0 \cdot 10^7$ кл/г, в контроле 1 и 2 (с цеолитом) – $4,5 \cdot 10^5$ и $3,0 \cdot 10^5$ кл/г соответственно.

Таким образом, результаты исследования показали эффективность применения нефтеокисляющих штаммов микроорганизмов для очистки нефтезагрязненных почв. При их внесении наблюдается снижение содержания нефти в почве, увеличивается ОМЧ и численность УОМ.

Наиболее активным оказался штамм *Microbacterium lacticum* 41-3, при внесении которого степень утилизации нефти составила 60,4%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мазур И.И., Молдаванов И.О. Курс инженерной экологии. М.: ВШ, 1999. 447 с.
 2. Национальная экологическая стратегия Республики Казахстана. МПРиООС РК.
 3. Ахметова К.К. Экологические последствия нефтехимического загрязнения / Мат. международной научной конференции «Состояние и перспективы развития почвоведения». Алматы: Тетис, 2005. С. 192.

4. Методы общей бактериологии / Под ред. Ф. Герхардта и др. М.: Мир, 1983. 536 с.

5. Практикум по микробиологии / Под ред. Н. С. Егорова. М.: МГУ, 1976. 307 с.

Резюме

Атырау облысында Жақаталап кен орындарында мұнаймен ластанған топырақты тазарту үшін мұнайтотық-тырныш микроорганизмдердің белсенді штамдары қолдануңа алынып зерттелді. Модельді зерттеулер нәтижесінде көрсеткіші бойынша, екі ай өткен соң көмірсу-тектотықтырныш микроорганизмдердің енгізгеннен кейін топырақта мұнайдың төмендеуі 25–60,4% болса, ал өндөлмеген топырақта тек 4,1% құрады. *Microbacterium lacticum* 41-3 штамы біршама белсенділігін көрсетіп, топыраққа енгізгеннен кейін мұнайдың ыдырау дәрежесі 60,4% -ке жонарылады.

Summary

The opportunity of using the active strains of oiloxidizing microorganisms for purification of oilpolluted soils of the deposit Zhanatalap of Atyrau region was studied. The results of the model experiments have shown, that in two months after entering hydrocarbonoxidizing microorganisms the loss of oil in soil was 25–60,4%, whereas in the non-treated soil only 4,1%. The strain *Microbacterium lacticum* 41-3 was the most active, it degraded 60,4 % of oil.

УДК 665.637

¹Институт микробиологии и вирусологии
МОН РК, г. Алматы;

²Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии им. У. У. Успанова» АО «КазАгроИнновация», г. Алматы;